剖腹產手術併發症說明書



輔英科技大學附設醫院

屏東縣東港鎮中山路 5 號

網址：//www.fy.org.tw

若有任何疑問，請直接與您的醫師詢問或電話諮詢。

☏ 婦產科門診（上班時間）：

8323146 轉 2610 或 2620

☏ 婦產科病房（24 小時）：

8323146 轉 3000 或 3001

1707-OG20

剖腹產手術併發症說明書

因剖腹產手術率的提高，對降低母兒死亡率有顯著成效，但也可能有術後出血、敗血症等併發症，且子宮有疤痕，太快懷孕有子宮破裂的可能，因此對剖腹產手術不僅要考慮近期併發症，也應考慮遠期影響。

剖腹產手術併發症

一、手術中：異常出血、失血性休克、羊水栓塞、腸子、膀胱或輸尿管損傷。

二、手術後：發燒、腹痛、傷口裂開、瀰漫性腹膜炎、血栓靜脈炎、傷口感染、晚期產後出血。

若經陰道生產，由於反覆宮縮及產道壓迫，胎兒肺部的羊水因而排出，出生後可以馬上呼吸，而未經陰道生產的剖腹產兒，常有反應遲緩的表現或偶有不同程度的呼吸抑制情形、低血氧症、窒息。

因剖腹產住院時間較久，且須插上導尿管，所以會增加泌尿道膀胱炎的可能性。任何手術都有可能造成日後大小腸或腹壁沾黏，嚴重時甚至造成腸阻塞。

剖腹產對未來懷孕造成的影響

一、前置胎盤和植入性胎盤的發生率也會增加，這兩種併發症往往會造成產前、產後出血，嚴重時需切除子宮。

二、術後在子宮上留下的傷口疤痕，在下次懷孕過程中有可能造成子宮破裂，發生率為 1%，一旦發生，產婦及胎兒死亡率很高。

麻醉的風險

剖腹產要承擔手術和麻醉的風險。由於懷孕婦女腹壓增加，較易引起嘔吐而導致吸入性肺炎。少部分的人因潛在的心、腦血管疾病，麻醉時易引起心肌梗塞、中風等，更有少部分特異體質，而造成過敏性休克。